

別紙5 感染性の疾病・その他

登園のめやす: 登園基準を満たし、医師の診断(登園許可証)を受け、全身状態がよくなり、給食を食べることができる

症状は個人により差がありますので医師によくご相談ください

患名		予防接種	主な症状	潜伏期間	登園基準(休ませる期間)	併発しやすい病気や症状
1	麻疹(はしか)	○	高熱、咳、鼻水、結膜炎。コプリック斑が頬の裏側に出る。やがて赤い発疹が全身に出る。	7~18日	解熱した後3日経過するまで。	中耳炎・肺炎・脳炎
2	風疹(三日はしか)	○	発熱、赤い発疹が全身に出る。目の充血、首のリンパ腺が腫れる。	14~23日	発疹が完全に消失するまで。	関節炎
3	水痘(みずぼうそう)	○	頭部、口腔内を含め赤い発疹が全身に出る。やがて水疱を形成し、かさぶたになる。	10~21日	すべての発疹がかさぶたになるまで。	皮膚の細菌感染症、肺炎
4	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	○	耳の下、あごの下の腫れと痛み、嘔吐、発熱。	12~25日	耳下腺及びあごの下の腫れが出現してから5日過ぎ、かつ全身状態が良くなるまで。	髄膜炎 難聴(片側だけの場合もある)
5	アデノウイルス感染症 咽頭結膜熱(プール熱)	—	高熱、咽頭炎、目の充血。目やに、まぶたの腫れ。	2~14日	主要症状が消失した後2日を経過するまで。 プール遊びは、1ヶ月水遊びでの対応。	
6	百日咳	○	咳が次第に強くなり、1~2週間特有の咳発作(コンコンヒュー)が出る。	5~12日	特有の咳が消えるまで。又は5日間の適正な内服治療を終了するまで。	肺炎・脳症
7	結核	○	2週間以上続く咳、痰、発熱。	数ヶ月~数十年	感染のおそれがなくなるまで。	結核性髄膜炎
8	髄膜炎 細菌性髄膜炎	—				
9	腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)	—	激しい腹痛、頻繁な水様便、さらに血便。発熱は軽度。	1~8日	症状が治まりかつ、抗菌剤による治療が終了し、48時間を経過し連続2回の検便で陰性が確認されるまで。	溶血性尿毒症症候群 脳症(3歳以下の発症が多い)
10	流行性角結膜炎(はやり目)	—	涙、目の充血、目やに、耳前リンパ節の腫脹と圧痛。	2~14日	結膜炎の症状が消失するまで。	
11	急性出血性結膜炎	—				
12	性胃腸炎全般(おなかの風邪)	—	発熱、嘔吐、下痢。	ノロウイルス 12~48時間 ロタウイルス 1~3日	症状が治まり、普段の食事ができ、全身状態が良くなるまで。プール遊びは、3週間水遊びでの対応。	脱水・けいれん・脳炎 まれに脳症
↓ 医師の診断を受け、登園届けを持参して、登園していただく感染症。感染拡大を防ぐため、基準を満たしていない場合は、お預かりできません。						
1	手足口病	—	1~5mmの水疱が手足口などに出る。	3~6日	口腔内の発疹がおさまり、全身状態が良くなるまで。	脳炎・髄膜炎・心筋炎
2	带状疱疹	—	小さい水を持った発疹が神経にそって帯状に出現。痛みが強い。	不定	全ての発疹が乾いて、かさぶたになるまで。	
3	溶連菌感染症	—	発熱、咽頭痛、いちご舌、発疹。	2~5日	抗生剤開始後24~48時間経過し、全身状態が良くなるまで。	リウマチ熱
4	RSウイルス感染症	—	発熱、鼻水、咳、呼吸困難。乳幼児は気管支炎から呼吸困難になりやすい。	2~8日	呼吸症状がおさまり、全身状態が良くなるまで。	乳児期:肺炎・細気管支炎
5	マイコプラズマ肺炎	—	咳、発熱、頭痛などの風邪症状がゆっくり進行。しつこい咳が特徴で、咳が1ヶ月以上続くケースもある。	7~28日	急性期が過ぎて症状が改善し、全身状態が良くなるまで。(医師の指示による)	重症肺炎・中耳炎 無菌性髄膜炎・脳炎
6	ヘルパンギーナ	—	高熱と咽頭痛、のどの奥の水疱が特徴。	3~6日	解熱後1日以上経過し、普段の食事ができること。 プール遊びは、1ヶ月水遊びでの対応。	脱水・けいれん
7	伝染性紅斑(りんご病)	—	軽い風邪症状のあと、頬が赤くなったり手足に網目状(レース様)紅斑が出る。	4~21日	全身状態がよければ登所可。	関節炎・溶血性貧血・紫斑病
8	突発性発疹	—	発熱後に発疹、高熱の為ひきつけを起こすこともある。	約10日	解熱後1日以上経過し、全身状態が良くなること。(医師の指示による)	熱性けいれん・脳炎 肝炎
9	伝染性膿痂疹(とびひ)	—	顔や手足に米粒大の赤い発疹。水疱からの浸出液が皮膚につくことで次々に発疹が増えていく。	2~10日	湿疹が乾燥していること。またはガーゼで覆えること。 治癒するまで水遊び×	アトピー性皮膚炎がある場合には重症になることがある
その他						
1	ヘルペス口内炎	—	口内炎、口周囲の水疱、口腔内の疼痛、口唇や歯肉の腫れ。	2~14日	哺乳・食事ができること。	
2	水いぼ	—	泡粒の様な小さな丘疹。脇下、皮膚が擦れ合う柔らかいところに来る。	2~7週間	症状によって対処していただくこと。治癒するまでプール×	
3	アタマジラミ	—	小児では初期は無症状のことが多くその後かゆみを伴う。髪の毛に成虫や卵がある。	10~14日 産卵からふかの期間	駆除を開始していること。	
4	インフルエンザ	○	発熱、悪寒、関節痛、咳、頭痛、下痢、嘔吐など。	1~4日	発症日を0日として、5日を経過し、かつ解熱した後3日間経過するまで。※登園許可証は必要なし。	肺炎・中耳炎・脳症 熱性けいれん
5	新型コロナウイルス	○	のどの痛み、咳、鼻水、発熱、味覚・嗅覚障害など。	2~7日	発症日を0日として、5日を経過し、かつ症状が軽快した後、24時間経過するまで。※登園許可証は必要なし。	様々な後遺症 糖尿病